

## Lakossági Tájékoztató

### Amit tudni kell a COVID 19 Moderna Vakcináról

#### **COVID 19 Moderna Vakcina vakcina összetétele**

A vakcina a vírus molekuláris szerkezetén alapuló technológia segítségével készült. Az oltóanyag mRNS-alapú, egy lipid nanorészecskébe csomagolt RNS molekulát (mRNS) tartalmaz.

#### **Hogyan véd a vakcina?**

A vakcina elősegíti, hogy az immunrendszer (a szervezet természetes védelme) antitesteket és a vírus ellen ható vérsejteket termeljen, így nyújtson védelmet a COVID 19 ellen.

#### **Kinél alkalmazható a védőoltás?**

COVID 19 Moderna Vakcina 18 éves és idősebb személyeknél alkalmazható.

#### **Okoz –e betegséget a vakcina?**

Mivel a COVID 19 Moderna Vakcina nem a vírust tartalmazza az immunitás kiváltásához, így nem okozhat Önnek COVID-19-betegséget.

#### **Hány adag szükséges a védettséghez?**

2 adag, 28 nap különbséggel.

A védettség a második adag után kb. a 14 napon alakul ki.

#### **Meddig tart a védettség?**

A vakcina által biztosított védelem ideje még nem ismert, meghatározása folyamatban van a jelenleg zajló klinikai vizsgálatok során.

#### **Felcserélhetőség**

A COVID 19 Moderna Vakcina nem cserélhető fel más COVID-19 elleni oltóanyagokkal.

#### **Kaphat-e oltást aki átesett COVID 19 betegségen?**

A teljes gyógyulást követően nincs ellenjavallata az oltás beadásának.

#### **Szükséges-e antigén gyorsteszt végzése az oltás beadása előtt?**

Az oltás előtt nem szükséges antigén gyorsteszt.

#### **Kaphat-e oltást, aki krónikus, alapterbetegséggel rendelkezik?**

Igen, az oltás krónikus betegséggel rendelkező személyeknek is adható, akiknél nem áll fenn oltásra vonatkozó kontraindikáció.

#### **Beadható-e együtt másik védőoltással?**

A COVID 19 Moderna Vakcina más oltóanyaggal egyidejűleg nem adható be.

Másik védőoltás legalább 14 napos időközzel adható.

## **Hogyan történik az oltás?**

A védőoltás beadása oltási terv alapján történik majd a kijelölt oltóponton.

Az oltóorvos az oltást megelőzően kérdőív segítségével kikérdezi és megvizsgálja.

Az oltás beadásáról minden esetben az oltóorvos dönt.

## **Az oltás ellenjavallatai**

Akut lázas betegség.

A COVID-19 Vaccine Moderna vakcina bármely összetevőjével szembeni súlyos allergiás reakció.

A COVID-19 Vaccine Moderna első adagjára anafilaxiás reakcióval reagáló személyeknek nem adható be a vakcina második adagja.

Az anamnézisben súlyos, kórházi ellátást igénylő gyógyszerrel (pl. penicillin) vagy védőoltással kapcsolatos anafilaxiás reakció.

Várandósság (Várandósság a második oltás után minimum 2 hónappal tervezhető).

## **Szoptatás alatt beadható-e a védőoltás?**

Nem ismert, hogy a vakcina kiválasztódik-e a humán anyatejbe.

Akik kockázati csoportba tartoznak és igénylik az oltást a szoptatás ideje alatt is megkaphatják.

## **Az oltás után kialakulhatnak mellékhatások (oltási reakciók)?**

Bármelyik védőoltás után jelentkezhet oltási reakció. A lehetséges oltási reakciókra az oltóorvos is fel fogja hívni a figyelmet.

## **Milyen mellékhatások (oltási reakciók) várhatóak?**

Oltási reakciók lehetnek: fájdalom és duzzanat a beadás helyén, fáradtságérzés, fejfájás, izomfájdalom, ízületi fájdalom, hidegrázás, láz esetleg bőrpirosodás az injekció beadásának helyén, émelygés.

Nagyon ritkán előfordulhat: megnagyobbodott nyirokcsomók, rossz közérzet, végtagfájdalom, álmatlanság, viszketés az injekció beadási helyén.

## **Mivel lehet kezelni az oltási reakciót?**

A felsorolt reakciók enyhítésére fájdalom- és lázcsillapító gyógyszer (pl. paracetamol, ibuprofen, metamizol) alkalmazható. Ezek azonban átmeneti reakciók, melyek szövődmények nélkül megszűnnek.

## **Hová lehet jelenteni oltási reakciót?**

Oltási reakciót lehet jelenteni az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek.

[https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszer\\_mellekhatas](https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszer_mellekhatas)

Oltási reakciót a Nemzeti Népegészségügyi Központnak is lehet jelenteni.